ЖИВАС ООД

бул. “Асен Йорданов” № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

ALDESEPT MD
АЛДЕСЕПТ MD

Концентриран алдехиден препарат за дезинфекция на инвазивни и неинвазивни медицински инструменти и апаратура

CE 1639

Приложение

Алдесепт MD е предназначен за дезинфекция на инвазивни и неинвазивни медицински и стоматологични инструменти, медицинска апаратура и лабораторна стъклария.

Алдесепт MD може да се използва както за ръчна дезинфекция, така и при всички полу-автоматични и напълно автоматични циркулационни процеси.

Свойства

Алдесепт MD представлява балансирана синергична система от алдехиди и четвъртични амониеви соли, която проявява висока микробиална активност в ниски концентрации. Препаратът не съдържа формалдехид и активните му съставки са биоразградими. Притежава отлични почистващи свойства. Алдесепт MD не се инактивира от органична материя. Съдържа инхибитори на корозия, не уврежда и е съвместим с различни материали, които могат да бъдат третирани многократно без да бъдат повредени. Работните разтвори на препарата са годни за употреба до 14 дни след приготвянето им. (Съхранявайте в затворен контейнер при стайна температура!)

Външен вид	безцветна ароматизирана течност
pH	4.5 - 5.5 (20°C)
Плътност (20°C)	1.040 g/cm^3

Състав на препарата

Всеки 100 g Алдесепт MD съдържат:

Активни вещества:

7.5 g	Глутаров алдехид (CAS 111-30-8)
15.0 g	Етилен диокси диметанол (CAS 3586-55-8)
2.0 g	Бензалкониев хлорид (CAS 68424-85-1)

Спомагателни вещества:

Изопропанол, инхибитор на корозия, парфюмна композиция

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Класификация:
Алдесепт МД отговаря на изискванията за химически дезинфектанти на Европейската директива за медицински изделия (MDD) 93/42 и е класифициран като медицинско изделие – Class IIb .

Спектър на действие
Бактерицидно, микобактерицидно (*вкл. TBC*), вирусоцидно, фунгицидно и спороцидно.

Микробиологична активност	Концентрация	Тест метод/Стандарт	Експозиция
Бактерицидна (*P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae)*	1.0%	EN 14561	30 min
Фунгицидна (*C.albicans, A.niger)*	1.0%	EN 14562	30 min
Микобактерицидна *(M.terrae)*	1.0%	EN 14348	60 min
Вирусоцидна (*Polio, Adeno, Noro)*	1.0%	EN 14476	60 min
Спороцидна *(Clostridium difficile)*	5%	EN 17126	120 min

(GHS05)

(GHS 08)

(GHS 09)

Сигнална дума: Опасно

Предупреждения за опасност:
H302 – Вреден при поглъщане
H332 – Вреден при вдишване
H318 – Предизвиква сериозно увреждане на очите
H334 – Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване
H335 – Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H315 – Предизвиква дразнене на кожата
H317 – Може да причини алергична кожна реакция
H400 – Силно токсичен за водните организми

Препоръки за безопасност:
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P261 Избягвайте вдишване на изпаренията
P280 Използвайте предпазни ръкавици от нитрилен каучук, предпазни очила, предпазна маска
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P302+P333+P313 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
P273 - Да се избягва изпускане в околната среда

Метод на приложение:

Работният разтвор се приготвя с питейна вода. Налейте необходимото количество вода в съд и постепенно добавете нужното количество от концентрата. Разбъркайте. **Третиране чрез потапяне**: (разглобете максимално и разкрийте отворите на всички инструменти, доколкото е възможно и ги потопете в разтвора. Уверете се, че всички повърхности и отвори на инструментите са напълно покрити и оставете препарата да действа). **Третиране чрез забърсване**: (Използвайте подходящо средство-кърпа, салфетка от нетъкан текстил или др., напоете го обилно с разтвора и забършете повърхността до пълно омокряне и оставете препарата да действа).

След изтичне времето на експозиция, изплакнете с вода третираните инструменти и ги подсушете.

Работните разтвори могат да се използват до 14 дни след приготвянето им.

Таблица за дозиране

Обект на дезинфекция	Спектър на действие	Работен разтвор	Експозиция
Дезинфекция и почистване на инвазивни и неинвазивни медицински инсрументи и медицински изделия	Бактерицидно, фунгицидно	1.0 %	30 min
	Микобактерицидно, вирусоцидно	1.0 %	60 min
	Спороцидно	5.0 %	120 min

Циркулационни процеси

Алдесепт MD е подходящ за всички полуавтоматични и напълно автоматични циркулационни процеси съгласно инструкциите на производителите на дезинфекционни автомати. Препоръчително е в този случай ръчно почистване на медицинските инструменти преди дезинфекция.

Съвместимост с други материали:

Метали: алуминий, неръждаема стомана, мед, месинг, анодизиран алуминий, хромиран месинг.

Синтетични материали: поливинилхлорид, полипропилен, полиетилен

Внимание: Да не се прилага върху порьозни, водо-неустойчиви материали и повърхности

Условия за съхранение:
Да се съхранява в затворена оригинална опаковка, в сухи и добре проветриви помещения защитени от пряка слънчева светлина, при температура от 0º до 40º С.
За повече подробности, вижте ИЛБ.

Третиране на отпадъчни количества и опаковки- съгласно указанията на местното законодателство. Да не се допуска изпускане на концентрата в околната среда - вижте специалните инструкции в информационния лист за безопасност.

Опаковка: (HDPE) флакони от 250 ml, бутилки 1000 ml, туби от 3 L и 5 L

Срок на годност: 3 години

ЖИВАС ООД
1592 София, Бул. „Асен Йорданов” №14
Тел/факс: +359 2 9817823, +359 2 9802507
zhivas@techno-link.com
www.zhivas.com